



AQUA BORDO

(Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grup	M:1	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-----	-------------------------

124 g/l Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur.

Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Elma karalekesi

1. Uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama : Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama : Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Şeftali yaprak kıvrıcılığı

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytinlerde halkalı leke

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,

2. Uygulama : Çiçek somakları belirlenlikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,

2. Uygulama : Çiçek somakları belirlenlikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz bölgesinde:

1. Uygulama : Hasattan sonra,

2. Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,

3. Uygulama : Çiçek somakları belirlenlikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Turuncgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamlanması

Meyve enfeksiyonlarına karşı :

1. Uygulama : Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

2. Uygulama : Havalar yağışlı giderse 1. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı : Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine % 3' lük polasyum permanganat dezenfektan olarak sürülmelidir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kaysı)

1. Uygulama : Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama : İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

AQUA BORDO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için AQUA BORDO'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

AQUA BORDO, diğer ilaçlarla (Insektisit, Fungisit, Bitki Gelişim Düzenleyicisi vs) karıştırılmadan, tek başına kullanılmalıdır.

02 Temmuz 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

W



RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR

Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

FABRİKA: İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes - İZMİR Tel: 0232 799 03 52-53

Tan Tarım

ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mansuroğlu Mah. 283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3
35535 - Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Faks: 0232 348 50 52
E-posta: info@tan-tarim.com.tr
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Bornova V. D. 818 003 5268