

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 22.09.2016/10765

KULLANILACAK İTİTİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

İTİTİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	14 Gün
	Ölülük (<i>Phomopsis viticola</i>)	3500 g/100 L su (Kış Uygulaması) 500 g/100 L su (Yaz Uygulaması)	14 Gün
CEVİZ	Ceviz antraknozu (<i>Gnomonia leptostyle</i>)	1. uygulama 1500 g/100 L su 2. uygulama 1000 g/100 L su	14 Gün
DOMATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da	14 Gün
ELMA	Karaleke (<i>Venturia iinaequialis</i>)	1500 g/100 L su	14 Gün
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophyllus</i>)	1250 g/100 L su (Dormant Dönem) 625 g/100 L su (Normal Dönem)	14 Gün
ŞEFTALİ	Yaprak kıvrıklılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g/100 L su	14 Gün
ZEYTİN	Haftalı leke (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	1. uygulama 1500 g/100 L su 2. uygulama 1000 g/100 L su	14 Gün

*Tüketime amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

İTİTİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan İTİTİ koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaysa karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan İTİTİ koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonunu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurarak sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

İTİTİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyösu
1. Uygulama: Süngün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca yapılmalıdır.
2. ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nem, nem, yağış gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enteksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.



BORDOTAN 20 WP

İslanabilir Toz (WP) (Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)		
GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)

%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

- ❖ Önce etiket okuyunuz.
- ❖ Evde kullanmayınız.
- ❖ Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- ❖ İTİTİ koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- ❖ İTİTİ koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- ❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızdan alındığında baş ağrısı, kusma ve sindirim sisteminde ağrılara neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıktan bol su ile yıkayın.
Gereklise derhal doktora başvurun.
Cilt: Temas halinde elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Anormal durum olursa doktora başvurun.
Yutma: Yutulduğu takdirde hasta kusturulmalı, ilacın ambalaj ve etiketini de götürerek doktora danışılmalıdır.
Solunum: Temiz havaya çıkın. Solunum zorluğu var ise suni teneffüs yapın. Zehir Danışma Merkezi veya doktoru arayın.

ANTİDOTU

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire-Başkanı



Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER

- 1) Bordo Karışımı
- 2) Sülfürik asit, mono-Cio-16-alkil esterler, sodyum tuzları

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H332: Solunması halinde zararlıdır.
- H410: Sucul ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P273: Çevreye verilmemesi için kaçınılmalıdır.
- P280: Korumaya eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanıma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İTİTİ koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arızalı zehirlidir. Çıçıklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınılmalıdır.
- Karışımı uzun süre püskürtüldüğünde içinde tutmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklik (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarda satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti eder. İmalatçılar ürünlerin hatalı depolanması, hatalı talimatı veya tavsiyelere uyumadaki eksiklik neticesinde vakti olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

Tan Tarım
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İZMİR
Tel: 0 232 349 0000 Faks: 0 232 349 0001
Ticaret Sicil No: 27643/K/33603
Çakabey VD 818 003 5268

Durmuş Demirel
Şirket Müdürü

Şirket Müdürü

Bağda Ölüko!

- Kış Uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

- Yaz Uygulaması:

1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Ceviz Antraknozu

Hastalığın her yıl şiddetli olarak seyrettiği yerlerde kimyasal mücadele gerekir.

1. Uygulama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakçıların kedi kulağı olduğu dönemde,
2. Uygulama: Yapraklardaki yaprakçıların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır.
3. Uygulama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde,
4. ve Diğer Uygulamalar: Yaşlı geçen yerlerde kullanılan Fungisit'in etki süresi (10 Gün) dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

Domates Mildiyöü

Domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kü gibi konidi örtüsünün görüldüğü ile uygulamaya başlanır.

Elma Karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktülünce,
4. ve Diğer Uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Dölen (Çil) (Kayısı)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak döktükünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
4. ve Diğer Uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvrıcılığı

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytinlerde Halkalı Loke

Marmara Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
4. Uygulama: Akdeniz Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
4. Uygulama: Hasattan sonra,
5. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce,
6. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

BORDOTAN 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M 1** olarak sınıflandırılmış bir Fungistidir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BORDOTAN 20 WP**'nin aynı ilaajın sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M 1** hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

CARISABİLİRLİK DURUMU

BORDOTAN 20 WP, diğer bitki koruma ürünleri ile (insektisit, Fungisit, Herbisit, Bitki Gelişim Düzenleyici vs.) karıştırılmadan tek başına kullanılabilir.



ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

BORDOTAN 20 WP

İslenabilir Toz (WP)

(Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)

GRUBU

M 1

Fungisit (Mantar İlacı)

%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

ÜRETİM YERİ

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes - İZMİR Tel: 0533 150 46 20-22



ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 Daire: 2-3 A Blok

Tel: 0.232.348 50 50 Beld. Geçer: 348 50 52

İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012

Ticaret Sicil No: 51643/K.33603

Çakabey VD. 818 003 5268

DURMUŞ DEMİREL

Şirket Vekili

Dr. Nesrin ÇAKIR A. CAN

Daire 5/1 5. kat



08 Kasım 2021