

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 11.10.2018/11232

KULLANILACAK İTİTİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

İTİTİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Mildiyö (Plasmopara viticola)	100 ml/100 L su	7 Gün
	Ölçek (Phomopsis viticola)	100 ml/100 L su	7 Gün
CEVİZ	Ceviz Antraknozu (Gnomonia leptostylis)	1. uygulama 500 ml/100 L su Diğer uygulamalar 250 ml/100 L su	7 Gün
DOMATES	Mildiyö (Phytophthora infestans)	200 ml/da	7 Gün
ELMA	Karaleke (Venturia inaequalis)	250 ml/100 L su	14 Gün
KAYISI	Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Döken (Comyneum belierincii)	500 ml/100 L su (Dormant dönem) 250 ml/100 L su (Normal dönem)	7 Gün
TURUNĞİL	Kahverengi leke (Alternaria f.sp. citri)	200 ml/100 L su	7 Gün
ZEYTİN	Halkalı leke (Spilocaea oleaginea)	250 ml/100 L su	14 Gün

*Tüketicim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

İTİTİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan İTİTİ koruma ürünü önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan İTİTİ koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda İTİTİ bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

İTİTİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyösu

1. Uygulama: Süngün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulamalıdır.

2. ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.



BUFFOON SC

Süspansiyon Konsantr (SC)

GRUBU	M 1	Fungist (Mantar İlacı)
361,1 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit		

- ❖ Önce etkeki okuyunuz.
- ❖ Evde kullanmayınız.
- ❖ Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- ❖ İTİTİ koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- ❖ İTİTİ koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- ❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanımı talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağıza madeni tat, kanlı ishal, bağ dönmesi, halsizlik, bulanık görme, anemi.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunum: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Şunu yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ciltte Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilen baş göstemesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. N. ÇAKIR AKIOĞAN



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1) Bakır Hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H330: Solunması halinde öldürücüdür.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P273: Çevreye verilmesinden kaçın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P601: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İTİTİ koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Bakılar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Aritara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Karşımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.
- Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklik (toterans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



ZİRAAT LAGANI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraktepe - 12 M.İ.İ.
Tel: 0.232.3548 50 50 Belge Geçerli: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0816003526600012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD.: 818 003 5268

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

Bağda Ölüklü

Kış Uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz Uygulaması:

1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. Uygulama: Sürgünlerin 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Ceviz Antraknozu

1. Uygulama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakçıkların kedi kulağı olduğu dönemde,
2. Uygulama: Yapraklardaki yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde,
3. Uygulama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde,
4. ve Diğer Uygulamalar: Yağışlı geçen yerlerde kullanılan Fungisit'in etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

Domates Mildiyesi

Çevrede domates yapırlarında 3-5 mm çapında, kahverengi lekelerin alt yüzünde, beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Elma Karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabadığıında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve Diğer Uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan biki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (GII) (Kayısı)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
- Kayışlarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılınca 3. uygulama yapılmalıdır.

Turunçgilde Kahverengi Loke

1. Uygulama: İkbaharda taze sürgünlerin oluştuğu dönemde hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde,
2. ve Diğer Uygulamalar: Kullanılan biki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak, meyveler yaklaşık 4 cm çapa ulaşana kadar devam edilir.

Zeytinlerde halkalı leke

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmenden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleşikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmenden hemen önce,
2. Uygulama: İkbahar sürgünleri görülmenden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleşikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
 2. Uygulama: İkbahar sürgünleri görülmenden hemen önce,
 3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleşikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.
- Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

Buffoon SC adlı biki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M 1** olarak sınıflandırılmış bir Fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip biki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **Buffoon SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M 1** hariç) biki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU

BUFFOON SC'nin diğer biki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

BUFFOON SC

Süspansiyon Konsantré (SC)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-----	-------------------------

361,1 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit

FİRMA BEYANI
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçılar ürünün hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

ÜRETİM YERİ

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes - İZMİR Tel: 0232 799 03 52-53



ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 Daire: 2-3 A Blok

35335 - Bayraklı - İZ M 1 R

Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52

İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012

Ticaret Sicil No: 51643/K.33603

Çakabey VD. 818 003 5268

Durmuş DEMİREL

Şirket Vekili