

Net Miktarı
Azami Perakende Satış Fiyatı :

ЗАДАЧА II КР | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



❖ Çocuklardan, aida ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI**

Büyük miktarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal ve uyku hali görülür.

Göz: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın.

En az 15 dakika uducalınlara devamlı eşuerek bir saygın uzmanın yardımını. **Çiile:** Kierlenmiş gylsiller çıkııııı. Çiildi hemem sabun ve suyla yıkısın. Yıkadıktan sonra belirlilerin baş göstermesi halinde hemem doktorlara başvurun.

Yıtuma: Ağzı, hemen galkalayın ve temiz havaya çıkın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Soluşma: Kazaadeyî hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Temiz havaya çıkın ve dinlendirin. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ozel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Uygulamanın tanıtılmamasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkammasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

18 Ekim 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Sulfotam 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	M2	Fungisit & Akarisit (Mantar & Kırmızı Örümcek ilacı)
-------	----	---

%80 Kükürt

H315: Cilt tahrişine yol açar.

P280: Koriyucu eldiven / koriyucu kiyafet / göz koriyucu / yüz koriyucu kullanın.

P501: İçindeki(leri) / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ❖ Kabakgiller ve kayısı kültürü hassastır.
- ❖ Yağ uygulamalarından en az 1 ay sonra kullanılmalıdır.
- ❖ Ürün atıklarını akarsu, göl, havuz ve çeşme yataklarına bulandırmayınız.
- ❖ Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçıların ürünlerini kalitesizni garanti eder. İmalatçıların ürünlerin hatalı depolanması, hatalı tabhki veya taşıyıcılara uymadıkları eksiklikli neticesinde vakti olacaktı zarar için sorumluluk kabuı etmez.

TAN TARIM ZIRAAT ILAÇLARI SAN. VE TIC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai-Hindistan
Fabrikta: Unit II, Plot No 230/231/232. Gidc, Estlaia Panoli
 Ankeshwar 394116, Gujarat, Hindistan

Ankleshwar 394116, Gujarat, Hindistan

ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET

ANQNM JIRHEI

Mansuroğlu M. / 3 / 2 St. No:5/1 D:2-3
35337 B. / 2 M / R

Tel: 0.232.348 50 52

Zim-Tec. Snc. Paris
Télégramme : 51643/K.33603

Barbova V.I., 818 003 5268

Alternur GÜZEL

And in 1991

Sirket Vekili

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Küllemesi

1. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm olduğunda,
2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcukları ayrıldığında,
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları dökülüp konuklar küçük sacma tanesi iriliğinde olduğunda,
4. ve Diğer Uygulamalar: Kullanılacak ürünün etki süresi, meteorolojik faktörler ve hastalığın seyri göz önünde bulundurularak, taraplara ben düşme zamanına kadar devam etmelidir.

Bağda Yaprak Uyuzu

Bağ Küllemesi'ne karşı kullanılan ürünler bu zararıyla da kontrol altına alındığından, Bağ Yaprak Uyuzu'na karşı özel bir uygulama gerekmez.

Begonya Küllemesi

Yapraklar üzerinde hastalığın belirtileri görüldüncce uygulamalara başlanır, birer hafta arayla uygulamalar tekrarlanır.

Eima Küllemesi

1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
2. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %60-70 döküldüncce,
3. ve Diğer Uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece, kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Fasulye Pasi

Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas: püstüllerinin görüldesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadıgından uygulamaya gerek yoktur.

Gül Küllemesi

Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.

Hiyar, Kabak, Kabakgillerde Külleme

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Nohut Anttraknozu

Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %60 olması durumunda başlanması gerekse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görüldesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilmelidir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşa uygulama tekrarlanmalıdır.

Soğan Mildiyəsi

Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekse de, çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

Şeftali Küllemesi

1. Uygulama: Sürgünler yaklaşık 20 cm olduğunda,
2. ve diğer Uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresine göre, enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar son uygulamaya ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek uygulamalar yapılır.

Turungul Kırmızı Örtümceği

Zararının taze sürgünlere geçmeden önce, yani çiçeklenmeden önceki devrede uygulamaya başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağlandıktan bir hafta sonra da uygulama yapılabilir. Ağaçların içi ve dışı, yaprakların alt ve üst yüzeyleri iyice kaplanmalıdır. Günün en sıcak ve yapraklardaki çğ dolaysıyla sabahın erken saatlerinde uygulama yapılmamalıdır.



Sulfotan 80 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	M2	Fungisit & Akarisit (Mantar & Kırmızı Örtümcek ilacı)
		%80 Küükürt

TANTARIM
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mansurözü Bulvarı No: 12, Şişli-Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27455 / Mers. No: 0818003526800012
Tic. Sic. No: 27455 / Mers. No: 0818003526800012
Bilgiye: 0212 335 52 68 / 0212 335 52 68
E-posta: info@tantarim.com.tr / info@tantarim.com.tr
www.tantarim.com.tr

Altınur GÜZEL
Şirket Vekili



18 Ekim 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Turunçgöller Tomurcuk Akarı
Zararı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, iklim koşullarına göre ilkbaharda sürgü 8-10 cm olduğu zaman, eski gözlerden yeni gözlere geçişin en fazla olduğu Mart sonu Nisan başları uygulama yapılır. İlk uygulamadan 20-25 gün sonra uygulama tekrarlanır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

SULFOTAN 80 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir Fungisit-Akarisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SULFOTAN 80 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU

SULFOTAN 80 WG, yazlık ve kışık yağlarla karışırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılacak ise bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



Sulfotan 80 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	M2	Fungisit & Akarisit (Mantar & Kırmızı Örtümcek ilacı)
		%80 Kükürt

5. 18 Ekim 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TANTARIM
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Mansuroğlu Mah. 203/12 Sk. Kat: 1 D:2-3
35231 B. K. - 12.111
Teli: 0232 3719 341 - 3719 342
Faks: 0232 3719 343
Ticari Sicil No: 51641/KC31605
Beyoğlu / D. 818 003 3268

Altınur GÜZEL
Şirket Vekili