

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 15.09.2021 / 12044

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Mildiyo (<i>Plasmopara viticola</i>)	175 g/100 L su	14 Gün
DOMATES	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 g/100 L su	14 Gün
KAYISI	Yaprak delen (Çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	1. ilaçlama: 400 g/100L su 2. ilaçlama: 200 g/100L su 3. ilaçlama: 200 g/100L su	14 Gün
PATATES	Mildiyo (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/da	14 Gün
ŞEFTALİ	Şeftali yaprak kıvrıcıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	300 g/100 L su	14 Gün
TURUNÇGİLLER	Uç Kurutan (<i>Phoma tracheiphila</i>)	200 g/100 L su	14 Gün
ZEYTİN	Halkalı Leke (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	175 g/100 L su	14 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

15 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GENEL KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



TANTARIM
ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

NAGA 2000

Suda Dağılılabılır Granül (WG)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-----	-------------------------

% 35 metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHRLENME BELİRTİLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimsede kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirletilmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin.

Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER
Bakır Hidroksit

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koryucu eldiven / koryucu kıyafet / göz koryucu / yüz koryucu kullanın.
P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bosalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arlara zehirli. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balkılar için zehirli. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Tan Tarım

ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İZ M I R
Teli: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD. 818 003 5268

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Miliyeti

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bögenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelette gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda, hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Kayısı Yaprak Delen (Çil)

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, (Pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken uygulanır.

Patates Miliyeti

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı

1. Uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. Uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Turunçgillerde Uç Kurutan

Yeşil Aksam Uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır. Toprak Uygulamaları: Yeşil aksam uygulamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, Ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde Halkalı Loke

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Akdeniz Bölgesi'nde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görüldükten hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

-Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

Naga 2000 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Naga 2000'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Naga 2000 diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

15 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.



ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

NAGA 2000

Suda Dağılılabılır Granül (WG)

GRUBU	M 1	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-----	-------------------------

% 35 metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüt (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR

Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

ÜRETİM YERİ

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes - İZMİR Tel: 0232 7990352-53



283/12 Sokak No: 5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İZ M I R
Tel: 0.232.348 50 50 Beige Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0816003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD. 818 003 5268

