

KULLANILACAK İTİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

İTİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Milidyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml / 100 L su	14 Gün
	Ölçek (Phomopsis viticola)	200 ml / 100 L su (Yaz ilaçlaması)	
DOMATES**	Milidyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml / 100 L su	14 Gün
	Etkin yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	175 ml / 100 L su	14 Gün
KAYISI	Yaprakdelen hastalığı (<i>Wissotomycetes carpophyllus</i>)	200 ml / 100 L su	90 Gün
ŞEFTALİ	Yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	300 ml / 100 L su	7 Gün
ZEYTİN	Haftalı leke hastalığı (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	150 ml / 100 L su	14 Gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

** Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırı Fungisitler'in tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik Fungisitler'in bulunmadığı yerlerde bakırı ürünlerle en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

İTİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan İtİ koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

16 Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İTİ ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞIYAKA

ZZ CUPROTAN 700 SC

Süspansiyon Konsantré (SC)

700 g/l Metalik Bakıra Esgdeğér Bakır Oksiklorid

Önce etikei okuyunuz.
Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
İTİ koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.

İTİ koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHLİRLENME BELİRTİLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etikei gösterin).

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Kazazede bayılmış ise eğitilmiş kişi tarafından suni solunum yapılabilir. Mümkünse oksijen verin. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutma: Kustummayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermayın. Kazazede yi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ciltte Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontakt lens varsa gözler yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilen baş göstemesi halinde hemen doktora başvurun.



ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.



ZARARLILIK İŞARETLERİ

Net Miktarı
Azamî Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
1) Bakır Oksiklorür

UYARI KELİMESİ
Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

H315: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410: Sıcucı ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273: Çevreye verilmesini kaçının.
P280: Korumucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P337+P313: Göz tahriş kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir. Akarsu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Ürün artıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklik (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Tan Tarım

ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayrakte - İZ M I R
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 081800326800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD. 818 003 5268

Durmuş DUTLU

Şişme 2011

Osman ARI
Daire Başkanı



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mıldıy

1. Uygulama: Sürün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca yapılmalıdır.
2. Ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, çift gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığına uygulamalara son verilmelidir.

Bağda Bitkisel

Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır. Yaz uygulaması: 1. Uygulama: sürünler 2-3 cm olduğunda, 2. Uygulama: sürünler 8-10 cm olduğunda, 3. Uygulama: sürünler 25-30 cm'yi bulduğunda yapılmalıdır.

Domates Mıldıyözü

Çevrede domates yapıkları 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kü gibi konidi örtüsünün görölmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Genek fidelekte gerekse tarlada ilk lekeler görölür görölmez uygulamaya başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Kayısı Yaprakdelen

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökölünden hemen sonra,
2. Uygulama: Çiçek tomurcukları kabadığı dönemde çiçekler açmadan önce,
3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erken organ tablası (kılıf) meyvenin ucuna sıyırıldığı dönemde yapılır.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı

Tomurcukların kabadığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytin Haikair Leke

Marmara Bölgesi:

1. Uygulama: Sonbahar sürünleri görölmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Ege Bölgesi:

1. Uygulama: İlkbahar sürünleri görölmeden hemen önce,
2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesi:

1. Uygulama: Hasattan sonra,
2. Uygulama: İlkbahar sürünleri görölmeden hemen önce,
3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ZZ CUPROTAN 700 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP M:1 olarak sınıflandırılmış bir Fungisitir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ZZ CUPROTAN 700 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına dzen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU

ZZ CUPROTAN 700 SC'nin Kalsiyum ve TMTD (Thiam) bazlı Fungisit içeren ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez. Organik fosforlu ile karıştımdan hemen sonra kullanılmalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır.



ZZ CUPROTAN 700 SC

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu M:1 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

700 g/l Metalik Bakıra Esgdeğer Bakır Oksiklorid

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömüre mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım maksadıyla Plazma ve Novadrol tatbik edilir. EDTA veya Penisilamine uygulanabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL.: 114

FİRMA BEYANI

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçılar ürünlerin hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde yaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

ÜRETİM TESİSİ:

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes - İZMİR Tel: 0533 150 46 20-22



ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No: 5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İZ M I R
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçen 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33503
Çakabey VD. 818 003 5268

Dünya Demirtaş
Genel Müdür



Osman ARI
Daire Başkanı

16 Temmuz 2021