

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

04.11.2021 / 12113

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 g/100 L su	21 Gün
DOMATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/100 L su	7 Gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 g/100 L su	7 Gün
KARPUZ	Alternaria yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	200 g/100 L su	28 Gün
PATATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g/100 L su	100 g/da** 7 Gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

** Patates mildiyösu için 50 lt/da su kullanılmaktadır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyösu

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve Diğer Uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çığ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

04 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



X-PERTAN

Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	M1	27	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----	-------------------------

%39,75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + %4,2 Cymoxanil

- ❖ Önce etiketi okuyunuz.
- ❖ Evde kullanmayınız.
- ❖ Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- ❖ Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- ❖ Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
- ❖ İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu ılık suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu ılık suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstemesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Nesrin ÇAKIRARICI
Dane Başkanı



Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Bakır Oksiklorid, Cymoxanil

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ
Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361fd: Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261: Tozunu solumaktan kaçının.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği / kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Karışımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Tan Tarım
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No:5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İZMİR
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD. 818 003 5268

Durmuş DEMİREL
Genel Müdür

Domates Mildiyö

Uygulamaya çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı

Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerinin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Patates Mildiyö

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla tekrarlanır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

X-PERTAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M 1** olarak sınıflandırılmış bir Fungisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **X-PERTAN**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup M 1** hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Geniş çapta bir karışım yapmadan önce, fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ve karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir.



X-PERTAN

Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	M1	27	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	----	----	-------------------------

%39,75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid + %4,2 Cymoxanil

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti eder. İmalatçılar ürünün hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı- İZMİR

Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52

ÜRETİM YERİ

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38

Menderes – İZMİR Tel: 0232 799 03 52/53

**Tan Tarım**
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
283/12 Sokak No.5/1 Daire: 2-3 A Blok
35535 - Bayraklı - İ Z M İ R
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Çakabey VD. 818 003 5268


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

04 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı